

## جدول التطعيمات في بريتش كولومبيا للرضع والأطفال

تبدأ مع بلوغ 4 سنوات (دخول روضة الأطفال)	18 شهرًا	12 شهرًا	6 أشهر	4 أشهر	شهرين	اللقاح
		<input checked="" type="checkbox"/>				<a href="#">لقاح جدري الماء (الحُمَاق) (#44b)<sup>1</sup></a>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">لقاح الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي من النوع ب وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع ب (DTaP-HB-IPV-Hib) (#105)</a>
	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">لقاح الخماسي المحسن ضد الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع ب (DTaP-IPV-Hib) (#15b)</a>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<a href="#">لقاح التهاب الكبد الوبائي من النوع أ (#33)</a> لأطفال السكان الأصليين فقط
	<input checked="" type="checkbox"/>					<a href="#">لقاح الإنفلونزا المعطل (الخامل) (#12d)<sup>2</sup></a> <a href="#">لقاح الإنفلونزا الموهن الحي (#12e)<sup>2</sup></a> سنويًا للرضع من سن 6 أشهر فما فوق (لا يُسمح بإعطاء لقاح الإنفلونزا الموهن الحي للأطفال الذين لم يبلغوا السنتين)
		<input checked="" type="checkbox"/>				<a href="#">لقاح الثلاثي الفيروسي الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (MMR) (#14a)</a>
<input checked="" type="checkbox"/>						<a href="#">لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجدري الماء (الحُمَاق) (MMRV) (#14e)<sup>1</sup></a>
		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">لقاح المتقارن للمكورات السحائية من النوع سي (Men-C) (#23a)</a>
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">لقاح المكورات الرئوية المتقارن (PCV 13) (#62a)</a>
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">لقاح الروتا (الفيروس العجلي) (Rotarix®) (#104a)</a>
<input checked="" type="checkbox"/>						<a href="#">لقاح الرباعي المحسن ضد الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا) والسعال الديكي وشلل الأطفال (Tdap-IPV) (#15a)</a>

<sup>2</sup> يوصى بإعطاء لقاح الإنفلونزا مرة سنويًا، وهو مجاني للأطفال من سن 6 أشهر فما فوق. على الأطفال الذين يتلقون اللقاح للمرة الأولى أخذ جرعتين يفصل بينهما 4 أسابيع.

**ملاحظة:** يمكن أن يتغير جدول التطعيمات. إذا كانت لديك أية استفسارات فتحدّث مع مقدّم الرعاية الصحية الخاص بك أو اتصل بالرقم **1-8-1-8**. وضع جدول التطعيمات هذا وراجعته HealthLinkBC، ووزارة الصحة في بريتش كولومبيا، ومركز مكافحة الأمراض في بريتش كولومبيا.

<sup>1</sup> لا يحتاج الأطفال الذين سبق لهم أن أصيبوا بجدري الماء أو الهربس النطاقي (الحزام الناري) عند سن عام فأكثر، بناءً على تأكيد الفحص المخبري، إلى لقاح جدري الماء، ولكن ينبغي عليهم أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) عند سن 4 سنوات.