

برنامه‌ی ایمن‌سازی برای نوزادان و کودکان بریتیش کلمبیا

شروع از 4 سالگی (ورود به کودستان)	18 ماهگی	12 ماهگی	6 ماهگی	4 ماهگی	2 ماهگی	واکسن
		<input checked="" type="checkbox"/>				واکسن <u>آبله مرغان (واریسلا)</u> (#44b) ¹
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن <u>دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هیپاتیت B، فلج اطفال، و هموفیلوس آنفلوانزای نوع b</u> (#105)
	<input checked="" type="checkbox"/>					واکسن <u>دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزای نوع ب</u> (#15b)
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			واکسن <u>هیپاتیت آ</u> (#33) فقط برای کودکان بومیان
	<input checked="" type="checkbox"/>					واکسن <u>غیرفعال آنفلوانزا</u> (#12d) ² واکسن <u>زنده تضعیف شده آنفلوانزا</u> (#12e) ²
		<input checked="" type="checkbox"/>				واکسن <u>سرخک، اوریون، سرخچه (MMR)</u> (#14a)
<input checked="" type="checkbox"/>						واکسن <u>سرخک، اوریون، سرخچه و آبله مرغان (MMRV)</u> ¹ (#14e)
		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن <u>کنژوگه (ترکیبی) مننگوکوک نوع ث (Men-C)</u> (#23a)
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن <u>دوگانه پنوموکوک (PCV 13)</u> (#62a)
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن <u>روتاویروس</u> واکسن <u>روتاویروس (روتاریکس®)</u> (#104a)
<input checked="" type="checkbox"/>						واکسن <u>کزاز، دیفتری، سیاه سرفه، فلج اطفال (Tdap-IPV)</u> (#15a)

² ایمن‌سازی سالانه در برابر آنفلوانزا توصیه می‌شود و به رایگان به کودکان 6 ماهه و بزرگتر ارائه می‌شود. برای کودکانی که برای نخستین بار این واکسن را دریافت می‌کنند، باید 2 دوز با فاصله 4 هفته از هم دریافت نمایند.

توجه: برنامه‌ی واکسن‌ها ممکن است تغییر کند. اگر پرسشی دارید، با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید یا با شماره‌ی **1-1-8** تماس بگیرید. جدول ایمن‌سازی توسط هلت لینک‌جی‌سی (HealthLinkBC)، وزارت بهداشت بی‌سی، و مرکز کنترل بیماری بی‌سی تدوین و بازبینی شده است.

¹ کودکانی که بنا به تشخیص آزمایشگاه در 1 سالگی یا بعد از آن آبله مرغان یا زونا گرفته‌اند نیازی به واکسن آبله مرغان ندارند. این کودکان باید در سن 4 سالگی واکسن MMR را دریافت نمایند.