



梅毒

Syphilis

梅毒是甚麼？

梅毒是一種由細菌引起的性傳播感染疾病（STI），它通過感染者的黏膜進行傳播。感染分為4個階段：初期、第二期、早期潛伏期和晚期潛伏期。

人們是如何感染梅毒的？

當您與帶有傳染性梅毒潰瘍（破損處）或疹子的感染者發生了皮膚接觸或體液交換，您就會被感染。具體來說，如果在親密接觸或性接觸的過程中碰觸了帶有梅毒潰瘍或疹子的口腔、生殖器或直腸，就會發生感染。患有梅毒的母親在懷孕或生產期間，亦可以把梅毒傳給嬰兒。

儘管女性和男性都會感染梅毒，但卑詩省大部分確診的梅毒患者都是同性戀、雙性戀或有男男性行為（MSM）的男士。有男男性行為的人士患有梅毒的概率較大，尤其是介於20-24歲之間的群體。

患有其他種類性傳播疾病的人士感染梅毒的機率會更高。

有何症狀？

每一階段的梅毒都有不同的症狀。症狀因人而異，又或很輕微，以致患者無法察覺自己感染了梅毒。

如需確定您是否患上梅毒，必須由醫護人員為您檢查並化驗血樣和潰瘍。

初期

在梅毒初期，您的身體與梅毒患者接觸過的部位會長出無痛的潰瘍。潰瘍一般在首次接觸後3周內出現，亦可在感染後的3至90天內於身體任何部位出現。有時，潰瘍並不明顯。幾週內，潰瘍會自行消失，但是仍具傳染性。

第二期

第二期一般在感染後約2至12周開始，但亦可在2週至6個月內於身體任何部位出現。這一階段，患者可能會出現不癢的疹子。疹子可以在身體任何部位出現，但一般均在胸部、腹部、生殖器、手掌及腳底。您可能不會注意到這些疹子，但它們仍具傳染性。疹子通常會消失，但數月後又會復發。其他症狀包括：頭痛；發燒；脫髮；淋巴結腫脹；口腔內、肛門、陰莖或陰道出現硬塊或粘膜斑塊。

潛伏期

疹子消退後，如不接受治療，梅毒會發展至潛伏期。您可能在一段時間內無任何症狀。潛伏期可能長達30年。

- 早期潛伏期：過去一年內感染的梅毒患者。處於該階段的患者更容易將疾病傳染給其性伴侶
- 晚期潛伏期：感染超過1年的梅毒患者。如不接受治療，梅毒感染者可能在數年間仍然沒有任何跡象或症狀

怎樣進行梅毒測試

造訪醫護人士並獲得前往化驗機構接受檢測的轉介，在那裡，您的血樣和任何潰瘡都將接受檢測。

我們建議男男性行為人士每3到6個月接受梅毒檢測，或者在出現症狀（潰瘡或疹子）後立即進行檢測。

我們建議孕婦在孕前篩檢時也進行梅毒篩查。如果您已懷孕，請在孕期與醫護人員探討STI風險因素，以確定進行包括梅毒在內的STI篩查的必要性。

您也可以在卑詩省部分化驗機構直接進行測試。如需查詢距您最近的檢測診所或在線接受測試，請瀏覽Smart Sex Resource，網站是<https://smartsexresource.com/sex-talk/talk-about-it> 以及/或者Get Checked Online，網站是www.getcheckedonline.com。

有哪些併發症？

如未接受梅毒治療，感染初期或幾年後可能出現併發症。併發症可能表現在神經性方面（例如失聰或失明，或感到暈眩），抑或腦部、心臟及身體其他器官受損，並且可以致命。

孕婦感染梅毒後如不經治療可能會給胎兒造成併發症，例如流產、早產或死胎，出生體

重過低，或導致胎兒出生後即患有梅毒（稱為先天性梅毒）。

有何治療方法？

任何階段的梅毒都可以用抗生素治療。抗生素治療不能恢復梅毒在晚期潛伏期造成的損害，但能阻止病毒進一步損害身體。接受治療後，您必須進行驗血以確定療程已發揮功效。

您的任何性夥伴均需接受檢測與測試；如感染，則需進行治療。不要性交，直至您和性伴侶完成治療後2周並確認治療已生效為止。

如果服用抗生素，避孕藥還起作用嗎？

鮮有證據顯示抗生素會降低激素類避孕手段的效力。激素類避孕手段包括藥片、避孕貼、節育環或避孕針。如果您正在接受抗生素治療，請務必遵循您的常規避孕手段。如果您有任何疑慮，可在抗生素治療結束後一直使用避孕套，直至下一次月經來潮為止，也可以諮詢您的醫護人員瞭解更多資訊。

更多資訊

如需瞭解有關如何降低罹患STI機率的更多資訊，請參閱[HealthLinkBC File #080預防性傳播感染（STI）](#)。



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

如需查找有關更多話題的HealthLinkBC文檔，請瀏覽 www.HealthLinkBC.ca/healthfiles 網頁或造訪您當地的公共衛生單位。如需在卑詩省內獲取非緊急健康資訊和建議，請瀏覽 www.HealthLinkBC.ca，或撥打免費電話 8-1-1。失聰和弱聽人士如需協助，請致電 7-1-1。若有需要，我們亦可提供 130多種語言的翻譯服務。