



ਹੈਪੋਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਵਿਗਾੜ

Hepatitis C Virus Infection

ਹੈਪੋਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਵਿਗਾੜ ਕੀ ਹੈ?

ਹੈਪੋਟਾਈਟਸ ਸੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈਪੋਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ (ਐਚ ਸੀ ਵੀ) ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਚ ਸੀ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਐਚ ਸੀ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਗੁਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਚ ਸੀ ਵੀ ਦੇ ਤੀਬਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਥਕੇਵਾਂ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲਗਣਾ
- ਬੁਖਾਰ
- ਪੇਟ ਦਰਦ
- ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ
- ਗੁੜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ਾਬ
- ਫਿੱਕੇ ਮਲ
- ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
- ਪੀਲੀਆ (ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ)

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਐਚਸੀਵੀ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਥਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਸ਼ਾ ਪਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾਂ ਹਨ। ਐਚ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਗੁਸਤ ਲਗਭਗ 75% ਲੋਕ ਚਿਰਕਾਲੀ (ਆਜੀਵਨ) ਵਿਗਾੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਹੈਪੋਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਵਿਗਾੜ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਹੈ?

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਐਚ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਐਚ ਸੀ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,300 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਗਾੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਚ ਸੀ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਵਰਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
- ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ
- ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਹੈਪੋਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ, ਏਸ਼੍ਵੀਆ, ਸਬ-ਸ਼ਹਾਰਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਔਸਟ੍ਰੇਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ਼ਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 1945 ਤੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ

- ਮੁੱਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ (ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੇਟੀਸ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ) ਵਿੱਚ ਐਚਸੀਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਨ
- ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਡੀਕਲ ਅਮਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ
- ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਐਚ ਸੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਖਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਚ ਸੀ ਵੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਸ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੋਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਵਿਗਾੜ ਹੈ?

ਐਚਸੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 5-10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਚਸੀਵੀ ਐਂਟੀਏਡੀਡੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਗੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੋ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੂਕਾਰੀ ਹੋ।

4 ਵਿਗਾੜਗੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕੁਦਰਤਨ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ; ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਲੋਕ ਚਿਰਕਾਲੀ ਵਿਗਾੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਾਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਿਰਕਾਲੀ ਵਿਗਾੜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 25% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਹੈਪੋਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਐਚਸੀਵੀ ਵਿਗਾੜ ਆਮੌਰਤ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਾੜ ਹੋਣਾਂ ਦਿੱਤੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਐਚਸੀਵੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੰਕਾਰ ਕੇ ਡਰੱਗ ਲੈਣ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਸਟਰਾਅ ਅਤੇ ਨਲੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
- ਖੂਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਐਚਸੀਵੀ ਲਈ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਅਚਾਨਕ ਹੈਪੋਟਾਈਟਸ ਸੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਜਾਂ ਸਰਿੰਜ ਲਗਣ ਨਾਲ
- ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਰੀ)
- ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਨ੍ਹਣ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਟ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨਾ, ਐਕਿਊਪੈਂਚਰ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲੋਸਿਸ, ਜੇ ਸਮਾਨ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ

ਦੂਸਰੇ, ਘੱਟ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਚਸੀਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਹਨ:

- ਜਿਨਸੀ ਸੰਭੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਲ੍ਹੇ ਜਥਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
- ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰਸ਼, ਡੈਟਲ ਫਲੋਸ, ਰੋਜ਼ਰ, ਨੇਲ ਫਾਇਲਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੀਮਨ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਮ੍ਮਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਚ ਸੀ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਐਚ ਸੀ ਵੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਣਾ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:

- ਸਰਸਰੀ ਸੰਪਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ
- ਖੰਘਣਾ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣਾ
- ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੇ ਲਗਾਊਣਾ ਅਤੇ ਢੁੰਮਣਾ
- ਉਹੀ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਕਟਲਰੀ ਵਰਤਣਾ
- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥਮ ਜਾਂ ਝਰੀਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲੋਰੀਨ ਵਾਲੇ ਛੂਲ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ
- ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਡੰਗ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਕੱਟਦਾ ਜਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ
- ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਕ, ਪੇਸ਼ਾਬ, ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚਸੀਵੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਪਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੰਗੀਓਲਾ ਤੇ ਦਰਾੜਾਂ ਹਨ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੰਦੀ ਸੂਈ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੰਦੀ ਸੂਈ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਟ ਲਗੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ
- ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ
- ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ

ਕੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਿਗਾੜ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਿਗਾੜ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਫਾਰਮਾਕੋਅਰ ਐਚਸੀਵੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ) ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਹਨ। 8 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਚਸੀਵੀ ਵਿਗਾੜ ਠੀਕ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਰਕਾਲੀ ਐਚਸੀਵੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਫਾਈਬ੍ਰੋਸਕਾਨ® (Fibroscan®) ਜਾਂ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ) ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਗਰ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਗਾੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹਿਊਮਨਇਮਿਊਨੋਡੇਫੈਸੈਂਸੀ ਵਾਇਰਸ (ਐਚਆਈਵੀ), ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ)।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ, ਨਿਯੂਮੋਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਨਫਲੂਅਨਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚਸੀਵੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਲਥਲਿੰਕਬੀਸੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇਖੋ:

- [HealthLinkBC File #12d ਇੰਨਾਈਕਟੀਵੇਟਿਡ ਇੰਨਫਲੂਅਨਜ਼ਾ \(ਫਲੂ\)](#) ਵੈਕਸੀਨ
- [HealthLinkBC File #25a ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਵੈਕਸੀਨ](#)
- [HealthLinkBC File #33 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਵੈਕਸੀਨ](#)
- [HealthLinkBC File #40b ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਿਡਾਊਣਾ](#)
- [HealthLinkBC File #62b ਨਿਯੂਮੋਕੋਲ ਕੌਨਜੁਗੇਟ \(ਪੀਸੀਵੀ 13\)](#) ਵੈਕਸੀਨ
- [HealthLinkBC File #102a ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ](#)
- [HealthLinkBC File #102b ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣਾ](#)
- [HealthLinkBC File #118 ਨੈਲੋਕਸੋਨ:ਅਧਿਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਮਿਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਾਜ](#)

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ (Hepatitis Education Canada)

<https://hepatitiseducation.med.ubc.ca/> ਤੇ ਜਾਓ



BC Centre for Disease Control

Provincial Health Services Authority