

# د واکسين کولو وروسته پاملرنه: لويان

زده کړئ چې په راتلونکو څو ورځو کې څه تمه وکړئ او د جانبي عوارضو وضعیت سره معامله څرنگې وکړئ.

د ځينو واکسينونو وروسته تاسو ممکن څه اړخيزې اغيزې ولرئ.



تبه، توخي او ليرزېدل



ستريا او سر درد



د عضلاتو او ګډ درد

د ايم ايم آر MMR او ويروسیلا واکسينونو کولو څخه 1-2 اونۍ وروسته تبه، خرابې او نور اړخيزې اغيزې ممکن واقع شي.



د COVID-19 واکسينونو وروسته: د بغل لاندې پيرسیدلي لمف نودونه هم کيدای شي



د انجیکشن په ځای کې درد، سوروالی او پيرسوب

کيدې شي د کورونا واکسين نه پس تر 7 ورځو پورې واقع شي.



التهاب، کانګي او اسهال

ډيرې اړخيزې اغيزې معتدل وی او د 1-2 ورځو وروسته له منځه ځي

د معافیت ځانګړي اړخيزو اغيزو لپاره دلته وګورئ:

[immunizebc.ca/adults/vaccines-recommended](https://immunizebc.ca/adults/vaccines-recommended)

د HealthLinkBC فایل لیدو لپاره د واکسين په نوم کلېک وکړئ.

کله طبي مرسته ترلاسه کړئ

د درملو احتیاط

د جانبي عوارضو لپاره احتیاطي تدابیر

راتلونکی مخونه د دې لپاره وګورئ:

پدې ژبو کې شتون لري: 简体中文 (ساده چينايي)، 繁體中文 (دوديز چينايي)، فارسی، 한국어 (کورین)، پنجابي (پنجابي) او نورې ژبې



## د واکسين کولو وروسته پاملرنه: لويان

### زه د بڼه احساس کولو لپاره څه کولی شم؟

د انجیکشن په ځای کې د درد او پرسوب لپاره:

- ✓ په هغه ځای یو یخ، لوند توکر یا د یخ پیک ولگول.
- ✓ خپل لاس ته په ورځ کې څو ځله حرکت ورکول.
- ✓ د طبي پلورنځي نه یو عام د درد درمل واخلي، لکه آئیبوپروفن (Advil®) یا ایسیټامنوفین (ټائیلنول).



د تبي لپاره:

- ✓ آرام وکړئ.
- ✓ ډیری مایعات وڅښئ.
- ✓ سپکي جامي واغونډئ.
- ✓ د تبي او د ناراحتی کمولو کې د مرستې لپاره د درد ضد درمل لکه آئیبوپروفن (Advil®) یا ایسیټامنوفین ټائیلنول واخلي.



### د کاونټر درملو د خونديتوب لارښوونې

- ✓ په لیبیل کې ټول لارښوونې ولولئ او تعقیب کړئ. د وړاندیز شوي مقدار څخه ډیر مه اخلئ.
- ✓ که تاسو امیندواره یاست، نو (Advil®) ibuprofen مه اخلئ. پرځای یې ایسیټامینوفین (Tylenol®) وکاروئ.

### تاسی کله د طبي پاملرنې غوښتنه وکړئ

د واکسين کولو وروسته جدي اړخيزې اغيزې خورا لږې دي. مگر که کله وشي، نو دا مهمه ده چې سمدستي اقدام وکړي.

**که چیرې لاندینې نښې شتون ولري سمدستي طبي پاملرنه وغورئ:**

- ✓ د شدید الرجیک عکس العمل نښې (د مثال په توګه، پوتکي، تنفسي ستونزه، د ژبي یا شونډو پرسوب). که دا د کلینیک څخه د وتلو وروسته پېښ شي، نو 911 یا خپل سیمه ایز بیروني لمبر ته زنگ ووهئ.
- ✓ که تاسو د کورونا واکسين اخیستی وي او د سینې درد، د ساه لنډی، یا د چټک زړه ضربان احساس، یا د زړه ټکان لري.
- ✓ نورې اندینې نښې او علائد.

د واکسين کولو وروسته جدي او/یا غیر متوقع اړخيزې اغيزې خپل د معافیت چمتو کونکي/کلینیک یا روغتیا پاملرنې چمتو کونکي ته راپور کړئ.

د خپل معافیت ریکارډ دلته ومومئ: [healthgateway.gov.bc.ca](http://healthgateway.gov.bc.ca)

