

برنامه‌ی ایمن‌سازی برای نوزادان و کودکان بریتیش کلمبیا

شروع از 4 سالگی (ورود به کودکستان)	18 ماهگی	12 ماهگی	6 ماهگی	4 ماهگی	2 ماهگی	واکسن
		<input checked="" type="checkbox"/>				واکسن آبله مرغان (واریسلا) ¹ (#44b)
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت B، فلج اطفال، و هموفیلوس آنفلوانزای نوع b (#105)
	<input checked="" type="checkbox"/>					واکسن دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزای نوع ب (#15b)
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			واکسن هپاتیت آ (#33) فقط برای کودکان بومیان
	<input checked="" type="checkbox"/> سالانه برای برای کودکان 6 ماهه تا 4 ساله					واکسن آنفلوانزای غیر فعال ² (#12d)
		<input checked="" type="checkbox"/>				واکسن سرخک، اوریون، سرخچه (MMR)(#14a)
<input checked="" type="checkbox"/>						واکسن سرخک، اوریون، سرخچه و آبله مرغان (MMRV) ¹ (#14e)
		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن توأم مننگوکوک-سی (#23a)
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن دوگانه پنوموکوک (PCV 13) (#62a)
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	واکسن روتاویروس (روتاتک®) (#104)
<input checked="" type="checkbox"/>						واکسن کزاز، دیفتری، سیاه سرفه، فلج کودکان (#15a)

² ایمن‌سازی سالانه در برابر آنفلوانزا توصیه می‌شود و به رایگان به 6 ماهه تا 4 ساله ارائه می‌شود. برای کودکانی که برای نخستین بار این واکسن را دریافت می‌کنند، نوبت دوم این واکسن به فاصله‌ی 4 هفته پس از نوبت اول توصیه می‌شود.

توجه: برنامه‌ی واکسن‌ها ممکن است تغییر کند. اگر پرسشی دارید، با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید یا با شماره‌ی 1-8-1-1 تماس بگیرید. جدول ایمن‌سازی توسط هلث لینک‌جی‌سی (HealthLinkBC)، وزارت بهداشت بی‌سی، و مرکز کنترل بیماری بی‌سی تدوین و بازبینی شده است.

¹ کودکانی که بنا به تشخیص آزمایشگاه در 1 سالگی یا بعد از آن آبله مرغان یا زونا گرفته‌اند نیازی به واکسن آبله مرغان ندارند. این کودکان باید در سن 4 سالگی واکسن MMR را دریافت نمایند.