

Calendario de vacunación para bebés y niños de B.C.

Vacuna	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	Comenzando a los 4 años de edad (Al acceder al jardín de infancia)
Vacuna contra la varicela (#44b) ¹				<input checked="" type="checkbox"/>		
Vacuna contra la difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b (DTaP-HB-IPV-Hib) (#105)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vacuna contra la difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b (DTaP-IPV-Hib) (#15b)					<input checked="" type="checkbox"/>	
Vacuna contra la hepatitis A (#33) Solo niños indígenas			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Vacuna desactivada contra la influenza (gripe) (#12d) ²				<input checked="" type="checkbox"/> Anualmente para niños entre 6 meses y 4 años de edad		
Vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR) (#14a)				<input checked="" type="checkbox"/>		
Vacuna contra el sarampión, paperas, rubéola y varicela (SPRV) (#14e) ¹						<input checked="" type="checkbox"/>
Vacuna meningocócica C conjugada (Men-C) (#23a)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Vacuna conjugada contra el neumococo (Prevenar 13) (#62a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Vacuna contra el rotavirus (RotaTeq®) (#104)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vacuna contra el tétanos, difteria, tos ferina y poliomielitis (Tdap-IPV) (#15a)						<input checked="" type="checkbox"/>

Nota: El calendario de vacunación puede cambiar. Hable con su proveedor de asistencia sanitaria, o llame al **8-1-1** si tiene dudas. Esta tabla de inmunización ha sido desarrollada y revisada por HealthLinkBC, el BC Ministry of Health (Ministerio de Salud de B.C.) y el BC Centre for Disease Control (Centro de control de enfermedades de B.C.).

¹ No es necesario que reciban la vacuna contra la varicela los niños/as que hayan contraído la varicela o el herpes zóster a la edad de un año o posteriormente, que haya sido confirmado por una prueba de laboratorio, pero deben recibir la vacuna SPR (MMR, en inglés) a los 4 años de edad.

² La inmunización anual contra la influenza está recomendada y se administra de manera gratuita a niños de entre 6 meses y 4 años de edad. Para los niños que reciban una vacuna contra la influenza por primera vez, se recomienda una segunda dosis 4 semanas después de la primera.