

Lịch Trình Chủng Ngừa cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em của B.C.

Thuốc chủng ngừa	2 tháng tuổi	4 tháng tuổi	6 tháng tuổi	12 tháng tuổi	18 tháng tuổi	Bắt đầu lúc 4 tuổi (Vào Mẫu Giáo)
Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Thủy Đậu (Trái Rạ) (#44b)¹				<input checked="" type="checkbox"/>		
Thuốc Chủng Ngừa Bạch Hầu, Sài Uốn Ván, Ho Gà, Viêm Gan B, Sốt bại liệt, và Trực Khuẩn Gây Viêm Màng Não loại b (DTaP-HB-IPV-Hib) (#105)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Bạch Hầu, Sài Uốn Ván, Ho Gà, Bại Liệt, Trực Khuẩn Gây Viêm Màng Não Loại b (DTaP-IPV-Hib) (#15b)					<input checked="" type="checkbox"/>	
Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Viêm Gan A (#33) Chỉ dành cho các trẻ em thổ dân bản địa (Indigenous) mà thôi			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Thuốc Ngừa Cúm (Flu) Khử Hoạt Tính (#12d)²			<input checked="" type="checkbox"/> Hàng năm cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi			
Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sởi, Quai Bị, Sởi Đức (MMR) (#14a)				<input checked="" type="checkbox"/>		
Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sởi, Quai Bị, Sởi Đức và Thủy Đậu (MMRV) (#14e)¹						<input checked="" type="checkbox"/>
Thuốc Chủng Ngừa Liên Hợp Chống Bệnh Viêm Não Loại C (Men-C) (#23a)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Thuốc Chủng Ngừa Liên Hợp Chống Khuẩn Cầu Phổi (PCV 13) (#62a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Thuốc Chủng Ngừa Rotavirus (RotaTeq®) (#104)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sài Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà, Bại Liệt (Tdap-IPV) (#15a)						<input checked="" type="checkbox"/>

Lưu ý: Lịch trình chủng ngừa có thể thay đổi. Hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị, hoặc gọi 8-1-1 nếu quý vị có thắc mắc. Bảng chủng ngừa này đã được soạn thảo và duyệt lại bởi HealthLinkBC, Bộ Y Tế BC và Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh của BC.

¹ Trẻ em nào đã bị bệnh thủy đậu hoặc bệnh giời leo, được xác nhận bởi một xét nghiệm thực hiện trong phòng thí nghiệm, lúc 1 tuổi hoặc sau 1 tuổi thì không cần chích thuốc chủng ngừa bệnh thủy đậu, và nên chích thuốc chủng ngừa MMR lúc 4 tuổi.

² Thuốc chủng ngừa cúm thường niên được đề nghị chích và được cung cấp miễn phí cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi. Với các trẻ em nào mới chích thuốc chủng ngừa cúm lần đầu tiên, một liều thứ nhì được đề nghị chích 4 tuần sau liều thứ nhất.